

1 Proposition de démonstration
2 de la conjecture de Syracuse
3 par Rémy Aumeunier

4
5
6 La conjecture de Syracuse, également connue sous le nom de problème
7 de Collatz, a été formulée par le mathématicien allemand Lothar Collatz
8 en 1937. Elle stipule que pour tout entier positif n , la séquence U_n atteint
9 finalement la valeur 1, en suivant les règles simples suivantes :

$$U_0 \in \mathbb{N}^* \quad U_{n+1} = \begin{cases} \frac{U_n}{2} & \text{si } U_n \text{ est un entier pair} \\ 3U_n + 1 & \text{si } U_n \text{ est un entier impair} \end{cases}$$

10 **1 Préambule**

11 Cette méthode proposée, implique de transformer la séquence U_n en une
12 forme polynomiale. L'analyse de la polynomisation de la séquence de Syracuse
13 offre une approche non conventionnelle pour examiner de manière approfondie le
14 comportement de ces séquences. À travers cette perspective, je vise à fournir des
15 éclaircissements qui pourraient apporter des éléments de réponse à la conjecture
16 ou à aborder ce problème d'une manière inattendue.

17 **2 Polynomisation de la séquence de Syracuse**

18 Pour effectuer la polynomisation des éléments de la suite de Syracuse, j'utilise
19 une variante de la méthode de Horner connue sous le nom de Ruffini-Horner.
20 Cette méthode permet d'associer une valeur à une représentation polynomiale.

$$U_0 \in \mathbb{N}^* \quad U_{n+1} = \begin{cases} \frac{U_n}{2} & \text{si } U_n \text{ est un entier pair} \\ 3U_n + 1 & \text{si } U_n \text{ est un entier impair} \end{cases}$$
$$\{q_x, p_x\} \in \mathbb{N} \quad u_0 \frac{3^p}{2^{q_0}} + \frac{3^{p-1}}{2^{q_1}} + \frac{3^{p-2}}{2^{q_2}} + \frac{3^{p-3}}{2^{q_3}} + \frac{3^{p-4}}{2^{q_4}} + \dots + \frac{3^{p_0}}{2^{q_n}} = u_n$$

21
22
23 Et si je considère la suite de Syracuse compressée

$$U_0 \in \mathbb{N}^* \quad U_{n+1} = \begin{cases} \frac{U_n}{2} & \text{si } U_n \text{ est un entier pair} \\ \frac{3U_n+1}{2} & \text{si } U_n \text{ est un entier impair} \end{cases}$$

24 Après arrangement ,j'obtiens une forme que je vais qualifier de canonique.Pusiqu'une
 25 multiplication par 3 implique obligatoirement une division par 2.

$$u_0 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^p \cdot \frac{1}{2^{q_0}} + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-1} \cdot \frac{1}{2^{q_1}} + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-2} \cdot \frac{1}{2^{q_2}} + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-3} \cdot \frac{1}{2^{q_3}} + \dots + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-n} \cdot \frac{1}{2^{q_p}} = u_n$$

26 Ainsi, chaque valeur de la séquence peut être associée à une transposition
 27 distincte . Cette transposition suit systématiquement une structure commune,
 28 imposée par la méthode Syracuse. Ici, p désigne le nombre de multiplications
 29 par 3 , tandis que la plus grande puissance de 2 reflète le nombre de divisions
 30 par 2 effectuées.

31 2.1 Application numérique

32 La polynomisation de la séquence de Syracuse est une simple transposition
 33 des valeurs.

$$U_0 \in \mathbb{N}^* \quad U_{n+1} = \begin{cases} \frac{U_n}{2} & \text{si } U_n \text{ est un entier pair} \\ 3U_n + 1 & \text{si } U_n \text{ est un entier impair} \end{cases}$$

$$U_{15} = \{46, 23, 70, 35, 106, 53, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1\}$$

34 J'écris toutes les valeurs intermédiaires sous forme de fraction.

$$\frac{\left(\frac{\left(\frac{\left(\frac{15 \cdot 3 + 1}{2}\right)^{\cdot 3 + 1}}{2}\right)^{\cdot 3 + 1}}{2}\right)^{\cdot 3 + 1}}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} \cdot 3 + 1$$

35 Que je réarrange ensuite sous forme de pseudo-polynôme.

$$\begin{aligned} & \left(\dots\right) + \frac{1}{2^4} \\ & \left(\dots\right) + \frac{3}{2^9} + \frac{1}{2^4} \\ & \left(\dots\right) + \frac{3^2}{2^{10}} + \frac{3}{2^9} + \frac{1}{2^4} \\ & \dots \\ & 15 \frac{3^5}{2^{12}} + \frac{3^4}{2^{12}} + \frac{3^3}{2^{11}} + \frac{3^2}{2^{10}} + \frac{3^1}{2^9} + \frac{3^0}{2^4} \end{aligned}$$

3 Proposition de démonstration

Dans cette proposition de démonstration, je vais considérer les valeurs intermédiaires à partir de leur représentation sous forme de pseudo-polynôme. Puis, étudier le comportement de q .

$$u_0 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^p \cdot \frac{1}{2^{q_0}} + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-1} \cdot \frac{1}{2^{q_1}} + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-2} \cdot \frac{1}{2^{q_2}} + \dots + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-n} \cdot \frac{1}{2^{q_p}} = u_n$$

u_n représente la n -ème valeur de la séquence de Syracuse, avec u_0 le premier élément de la suite. La variable p dénombre les valeurs impaires rencontrées au cours des itérations, tandis que q_0 correspond au nombre de divisions par 2 surnuméraires liées aux entiers pairs de la forme $(2^{p>1}n_a)$. C'est précisément l'évolution de q_0 , qui est monotone croissante parce qu'il comptabilise les divisions par 2 surnuméraires, qui démontre la convergence inéluctable de la suite vers 1. En effet, la limite de q_0 nous permet d'établir une relation d'ordre, et d'avoir $u_0 \cdot \frac{3^p}{2^{p+q_0}} \approx 0$ se qui fait converger la suite vers 1.

$$\left\lfloor \frac{u_0 \cdot 3^p}{2^{p+q_0}} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{3^{p-1} + \dots + 3^{p_0} \cdot 2^{b_n}}{2^{p+q_0}} \right\rfloor + (u_0 \cdot 3^p + 3^{p-1} + \dots \cdot 2^{b_n}) \bmod(2^{p+q_0})$$

$$0 + 0 + \frac{u_0 \cdot 3^p + 3^{p-1} + \dots + 3^{p_0} \cdot 2^{b_n}}{2^{p+q_0}} = \frac{2^{p+q_0}}{2^{p+q_0}} = 1$$

3.1 Application numérique :

Avec en gras, les divisions que j'ai qualifiées de surnuméraires.

$$u_n = \{23 - 70 - 35 - 106 - 53 - 160 - \mathbf{80} - \mathbf{40} - \mathbf{20} - \mathbf{10} - 5 - 16 - \mathbf{8} - \mathbf{4} - \mathbf{2} - 1\}$$

$$\frac{23 \cdot 3 + 1}{2} = 35$$

$$34.5 + 0.5 = 35 \quad , \quad \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\frac{23 \cdot 3^2}{2^2} + \frac{3}{2^2} + \frac{1}{2} = 53$$

$$51.75 + 1.25 = 53 \quad , \quad \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 2.25$$

$$\left(\frac{23 \cdot 3^3}{2^3} + \frac{3^2}{2^3} + \frac{3}{2^2} + \frac{1}{2}\right) \div 2^4 = 5$$

$$\frac{23 \cdot 3^3}{2^3} \cdot \frac{1}{2^4} + \frac{3^2}{2^3} \cdot \frac{1}{2^4} + \frac{3}{2^2} \cdot \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^4} = 5$$

$$4.8515625 + 0.1484375 = 5 \quad , \quad \left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{2^4} = 0.2109375$$

$$\left(\frac{23 \cdot 3^4}{2^4} \cdot \frac{1}{2^4} + \frac{3^3}{2^3} \cdot \frac{1}{2^5} + \frac{3^2}{2^2} \cdot \frac{1}{2^5} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2}\right) \div 2^3 = 1$$

$$\frac{23 \cdot 3^4}{2^4} \cdot \frac{1}{2^7} + \frac{3^3}{2^3} \cdot \frac{1}{2^8} + \frac{3^2}{2^2} \cdot \frac{1}{2^8} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^4} = 1$$

$$0.90966796875 + 0.09033203125 = 1 \quad , \quad \left(\frac{3}{2}\right)^4 \cdot \frac{1}{2^7} = 0.03955078125$$

50 Ici le coefficient $\frac{1}{2^{90}} = \frac{1}{2^7}$ Parcequ'il y a 7 divisions surnuméraires ,qui sont
51 associé aux valeurs **{80 - 40 - 20 - 10 - 8 - 4 - 2 }**.

52 3.2 Fréquence des entiers de la forme $2^{n>1} \cdot n_a$

53 Dans le corpus académique, il existe de nombreuses preuves qui établissent
54 l'impossibilité d'une alternance infinie d'entiers pairs et impairs. Ce qui suit
55 n'est pas une démonstration académique, mais permet de justifier la présence
56 d'entiers de la forme $(2^{p>1}n_a)$. Pour cela je considere une suite Syracuse.

$$U_n = \{31, \mathbf{94}, 47, \mathbf{142}, 71, \mathbf{214}, 107, \mathbf{322}, 161, \mathbf{484}, 242, 121\}$$

57 Puis,les entiers pairs, et je calcule le coefficient multiplicateur.

$$58 \quad \{94 = 2 \cdot 47 \quad 142 = 2 \cdot 71 \quad 214 = 2 \cdot 107 \quad 322 = 2 \cdot 7 \cdot 23 \quad 484 = 2^2 \cdot 11 \quad \dots\}$$

$$59 \quad 142/94 = 1.5106\dots \quad , \quad 214/142 = 1.5070\dots \quad , \quad 322/214 = 1.5045\dots$$

60 Ces coefficients n'étant pas des entiers, ils ne permettent pas de réutiliser les
61 grands nombres premiers dans la décomposition des éléments de la suite de
62 Syracuse. Cela implique que les puissances apparaissent très rapidement sur les
63 petits nombres premiers. De plus, en considérant une paire impair/pair, ces deux
64 entiers sont premiers entre eux $(u_n \cdot 3 + 1)$. Ce qui implique que l'on ne peut pas
65 utiliser 3 comme nombre premier dans la décomposition de U_n pair, ce qui rend
66 les entiers de la forme $(2^{n>1} \cdot n_a)$ obligatoires et fréquents, dans un voisinage
67 relativement proche d'un élément pair de la suite.

68 3.3 Unicité du Cycle

69 Dans cette proposition de démonstration de l'unicité du cycle $\{4, 1, 4, 1, \dots\}$,
70 je propose de considérer un cycle et d'analyser la transposition polynomiale du
71 cycle en calculant plusieurs occurrences de même valeur $U_a = U_{a+xn}$

$$U_a = \{2U_1, 2^2U_2, 2U_{a+n}, 2U_1, 2^2U_2, 2U_{a+2n}, 2U_1, 2^2U_2, 2U_{a+3n}, \dots\}$$

$$U_a \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = U_1 \quad U_a \frac{3^2}{2^3} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^2} = U_2 \quad U_a \frac{3^3}{2^4} + \frac{3^2}{2^4} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2} = U_{a+n}$$

$$\frac{3^3}{2^4} \left(U_a \frac{3^3}{2^4} + \frac{3^2}{2^4} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2} \right) + \frac{3^2}{2^4} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2} = U_{a+2n}$$

$$\left(\frac{3^3}{2^4} \right)^2 \left(U_a \frac{3^3}{2^4} + \frac{3^2}{2^4} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{3^3}{2^4} \right)^1 \left(\frac{3^2}{2^4} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{3^3}{2^4} \right)^0 \left(\frac{3^2}{2^4} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2} \right) = U_{a+3n}$$

$$k = \frac{3^3}{2^4} \quad , \quad U_a \cdot k^{n+1} + \sum_{i=0}^{n \neq \infty} k^i \left(\frac{3^2}{2^4} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2} \right) = U_{a+xn}$$

72 Si $k > 1$ il ne peut pas exister de cycle parce que $U_a \cdot k^{n+1} > U_{a+xn}$, pour
73 $0 < k < 1$.

$$U_a \cdot k^{n+1} \searrow \quad , \quad \frac{(\dots)}{2^{\dots}} \sum_{i=0}^{n \neq \infty} k^i \quad , \quad (\dots) \bmod(2,3) \neq 0$$

74 Cette polynomisation du cycle, permet une mise en facteur d'une constante, avec
75 un numérateur qui n'est pas divisible par 2 et 3, ce qui implique que $U_{a+x} \notin \mathbb{N}^*$,
76 parce que $k = \frac{3^p}{2^q}$, ce qui démontre l'unicité du cycle trivial parce qu'il n'y a
77 que des entiers dans la suite de Syracuse. Pour le cycle trivial $\{4, 1, 4, 1, \dots\}$,
78 l'étude de la limite permet de corroborer la proposition de démonstration, de
79 vérifier par le calcul la valeur de k et de l'occurrence.

$$U_a = 1 \quad , \quad \frac{(\dots)}{2^{\dots}} = \frac{1}{2^2} \quad , \quad k = \frac{3}{2^2}$$

$$k^{n+1} + \frac{1}{2^2} \sum_{i=0}^n k^i = 1 \quad , \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(k^{n+1} + \frac{1}{2^2} \cdot \frac{1}{1-k} \right) = 1 \in \mathbb{N}^* \quad , \quad k = \frac{3}{4}$$

80 3.4 Généralisation par substitution

81 On peut, si l'on le souhaite, généraliser le calcul de la suite ici, 3 devient 5

$$U_0 \in \mathbb{R}^* \quad U_{n+1} = \begin{cases} \frac{U_n}{2} & \text{si } U_n \text{ est un entier pair} \\ 5U_n + 1 & \text{si } U_n \text{ est un entier impair} \end{cases}$$

82 Avec comme critère de convergence pour $3U+1$:

$$\frac{3^n}{2^{(n+\frac{2n}{3})}} < 1$$

83 Tandis que, pour le cas $5U+1$, j'ai :

$$\frac{5^n}{2^{(2n+\frac{n}{3})}} < 1$$

84 Ce qui implique qu'il faut seulement $2/3$ de division par 2 en plus, tandis que
85 pour la suite $5x+1$, il en faut plus de 2 fois plus. Ce qui fait que la suite diverge
86 en dehors de quelques cas rares ou très spécifiques, s'ils existent.

87 3.5 Récurrence

88 Cette approche permet aussi de raisonner par récurrence. Si je considère un
89 grand entier u_0 , chaque fois que la partie entière de la division dans le calcul
90 de u_n sera égale à zéro, je peux repartir de cet entier différent de 1, et ne
91 plus prendre en compte l'ancienne transposition, pour construire une nouvelle
92 séquence, et ainsi de suite jusqu'à ce que la suite soit égale à 1.

$$0 + n_x \cdot \frac{\dots}{2^{q_0}} = u'_0$$

$$u'_0 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^p \cdot \frac{1}{2^{q_0}} + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-1} \cdot \frac{1}{2^{q_1}} + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-2} \cdot \frac{1}{2^{q_2}} + \dots + \left(\frac{3}{2}\right)^{p-n} \cdot \frac{1}{2^{q_p}} = u_n$$

93 4 Remerciement

94 Cette proposition de démonstration n'aurait pas été aussi simple et donc
95 difficilement contestable sans ChatGPT, cette IA m'a permis d'explorer quelques
96 impasses et d'aborder les problèmes de manière à exclure les complexités inutiles.
97 Et cela malgré ces aberrations pour rester politiquement poli avec l'IA.

98 Références

- 99 [1] Shalom Eliahou, « La conjecture de Syracuse : élémentaire, mais redoutable
100 [archive] », sur Pour la Science, 8 avril 2019..
- 101 [2] Simon Letherman, Schleicher et Wood, « The $(3n + 1)$ -Problem and
102 Holomorphic Dynamics », *Experimental Mathematics*, vol. 8, no 3, 1999
- 103 [3] David Barina, « Convergence verification of the Collatz problem », *The
104 Journal of Supercomputing*, vol. 77, no 3, 2020, p. 2681–2688.
- 105 [4] Jean-Paul Delahaye et Christian Lasou, « La conjecture de Syracuse
106 [archive] », sur Université de Lille1, 2008-2009..
- 107 [5] Terence Tao, « Almost all Collatz orbits attain almost bounded values
108 [archive] », sur What's new, 10 septembre 2019..
- 109 [6] (en) Sinyor, J., « The $3x+1$ Problem as a String Rewriting System
110 » [archive], *International Journal of Mathematics and* .

- 111 [7] (en) Jeffrey C. Lagarias, « The $3x + 1$ problem and its generalizations
112 » , Amer. Math. Month., vol. 92, no 1, janvier 1985, p. 3-23 (JSTOR
113 10.2307/2322189, lire en ligne [archive]).
- 114 [8] (fr) Luc-Olivier Pochon, Alain Favr, La suite de Syracuse, un monde de
115 conjectures ,2017. hal- 01593181v1.